

## Impfkalender nach Empfehlungen der ständigen Impfkommision am Robert Koch-Institut (STIKO)

Impfungen gegen	Alter in Wochen	Alter in vollendeten Monaten					Alter in vollendeten Jahren				
	6	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-14	12-17	ab 18	über 60
Wundstarrkrampf		✓	✓	✓	✓		✓	←	✓	***	→
Diphtherie		✓	✓	✓	✓		✓	←	✓	***	→
Kinderlähmung		✓	✓*	✓	✓			←	✓#	→	
Keuchhusten		✓	✓	✓	✓		✓	←	✓#	→	
Haemophilus influenzae B		✓	✓*	✓	✓						
Hepatitis B		✓	✓*	✓	✓			←	✓##	→	
Pneumokokken		✓	+	✓	✓						✓
Masern					✓	✓				△	
Mumps					✓	✓					
Röteln					✓	✓					
Windpocken					✓	✓		←	✓**	→	
Meningokokken C					1x ✓	ab dem 12. Monat					
Humane Papillomaviren								✓	++		
Influenza											✓###
Rotaviren	✓◇	✓	←(✓)→								

\* kann entfallen bei Verwendung eines Einzelimpfstoffes.

\*\* ungeimpfte 9-17jährige, die noch keine Windpocken hatten.

\*\*\* jeweils 10 Jahre nach der letzten vorangegangenen Dosis. Alle Erwachsenen sollten die nächste fällige Impfung gegen Wundstarrkrampf/Diphtherie einmalig als Kombinationsimpfung mit dem Impfstoff gegen Keuchhusten erhalten.

# einmalig

## Grundimmunisierung, wenn noch nicht geimpft

### jährlich

△ Wer nach 1970 geboren und 18 Jahre oder älter ist, sollte überprüfen, ob er in der Kindheit wirklich zweimal gegen Masern geimpft wurde. Ist dies nicht der Fall, oder kann diese Frage nicht geklärt werden, wird eine einmalige Impfung gegen Masern empfohlen - vorzugsweise mit dem Dreifach-Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln.

◇ Die erste Impfung sollte ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen. Je nach Impfstoff sind zwei bzw. drei Dosen im Abstand von mindestens vier Wochen erforderlich.

+ Nur für Frühgeborene!

++ Zwei Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten